



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

*Direttore: dr. Giancarlo Ricciardelli*

**Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 3**

Casapulla-Curti-San Prisco-S.Maria C.V.-SanTammaro Cannello Arnone

Grazzanise S.Maria La Fossa

*Responsabile Dr. A.Maria Vigliano*

Via Giotto – 81055 S.MARIA C.V. (CE) tel.0823/797429 pec:uopc.santamariacv@pec.aslcaserta.it

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo"

Cannello Arnone

Asl CE Prot. n. 0255752/UOPC2138 del 02-11-2023



SEGNALAZIONE DI UN CASO DI SCABBIA NEL...

OGGETTO: segnalazione di un caso di scabbia nella Scuola Primaria.

Si comunica che in data odierna è pervenuta la segnalazione di un caso accertato di scabbia che è risultato, dall'inchiesta epidemiologica effettuata, essere alunna della scuola primaria.

Pertanto si allega alla presente una nota informativa indirizzata ai genitori e al personale scolastico per opportuna conoscenza.

Restando disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

La Responsabile UOPC Ambito 3

Dott.ssa Vigliano Anna Maria



## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

*Direttore: dr. Giancarlo Ricciardelli*

**Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 3**

Casapulla-Curti-San Prisco-S.Maria C.V.-SanTammaro Cancellò Arnone

Grazzanise S.Maria La Fossa

*Responsabile Dr. A.Maria Vigliano*

Via Giotto - 81055 S.MARIA C.V. (CE) tel.0823/797429 pec:uopc.santamariacv@pec.aslcaserta.it

Ai Genitori

Al Personale Scolastico

Oggetto: comunicazione sanitaria

Nella Scuola Primaria si è verificato di recente un caso di scabbia

La scabbia è una malattia della pelle causata da un parassita , l'acaro della scabbia , che provoca lesioni papulari arrossate e intensamente pruriginose in determinate aree quali ad esempio : pieghe interdigitali, superfici flessorie dei polsi ed estensorie dei gomiti, pieghe ascellari , ombelico , genitali.

Nei bambini possono essere interessati anche il collo, viso, palmo della mano.

Il prurito è più forte di notte .

La parassitosi si trasmette mediante stretto contatto personale con una persona infetta ( es. dormire nello stesso letto) . La contagiosità dura fino a che gli acari e le loro uova non vengono distrutte dal trattamento, generalmente dopo 1-2 cicli di trattamento intervallati da una settimana.

La trasmissione indiretta attraverso abiti o altri effetti personali è possibile ma molto difficile. I parassiti infatti non sopravvivono più di 3-4 giorni nell'ambiente al di fuori della pelle.

Il periodo di incubazione è di 4-6 settimane.

La Scabbia è diffusa in tutto il mondo e colpisce tutte le razze e le classi sociali indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'igiene personale.

I soggetti infetti sono allontanati fino al completamento del trattamento specifico.

**Si raccomanda i genitori di rivolgersi tempestivamente al medico curante, qualora insorgessero prurito o lesioni sospette nei bambini/ragazzi nelle prossime settimane.**

La Responsabile UOPEC Ambito 3

Dott.ssa Vigliano Anna Maria